



ApiH Sårsalva

ÄR EN **H¹³** PRODUKT

Beskrivning

Den nyutvecklade och patenterade pilotprodukten ApiH:s aktiva substans är 13 levande mjölksyrabakterier och dess bioaktiva substanser, i en matrix av svensk pastöriserad ljunghonung och vatten. Produktens styrka är den unika, patenterade sammansättningen av nio *Lactobacillus* och fyra *Bifidobacterium* arter från honungsbin som redan är anpassade till honungsmatrixen. Det är samma sammansättning och koncentration som Tekn. dr Alejandra Vásquez och Tekn. dr Tobias Olofsson upptäckte i sin forskning vid Medicinsk Mikrobiologi, Lunds universitet. ApiH kommer som salva i tub och levereras i en förpackning innehållandes fyra tuber á 18g / tub.

Denna unika H13 produkt är ämnad för sårbehandling inom veterinärvård.

Produkten förvaras i frys för att bevara bakterierna inaktiva tills behandlingen påbörjas. Förvara alltid tuberna frysta när de inte används.

SÅRBEHANDLINGSPROCESSEN

Följ instruktionen nedan noga!

Steg 1. Sårbehandlingen innebär att salvan appliceras direkt i såret från en tub ApiH direkt från frys. ApiH appliceras med fingrarna jämnt över hela sårytan. **Vid behandling av muggsår som inte redan är öppna sår, tas så mycket sårskorpa som möjligt bort, för att komma åt såret men utan att medföra lidande för hästen.** En tub som har innehåll kvar förvaras med fördel i frys och används igen vid nästa behandlingstillfälle.

Steg 2. Anpassa en steril kompress till sårets storlek. Applicera ApiH salva på såret. Fukta kompressen lagom med kranvatten och applicera över det behandlade såret (Fig. A.). På de sår som är för svåra att komma åt för att applicera ApiH direkt i såret, kan salvan appliceras över centrum på kompressen istället.

Steg 3. För att hålla kompressen på plats appliceras ett lämpligt förband över. En porös skumplast (Animal Polster) med en självhäftande sida kan användas (Fig. B.), men då ett traditionellt förband av bomull och gasbinda kan användas bör det föredras eftersom ett sådant förband sitter bättre.

Steg 4. Bandagen kan bytas efter 2 dagar men också tidigare vid behov beroende på om djuret lyckats att förstöra/avlägsna bandagen. Inspektera nu också hur läkningsprocessen fortskrider.

Steg 5. Upprepa behandlingen tills dess att såret läkts vilket normalt tar mellan 10-20 dagar, men kan variera för enskilda fall. När såret är stängt och hår kommer tillbaka avbryts behandlingen.



(Fig. A.)



(Fig. B.)



www.apih.se



ConCellae AB, Bårslövsv. 3
253 73 Gantofta, Sverige



info@apih.se